

Nazorginstructies

BBL® HEROic™ SkinTyte II™

De reactie van patiënten na een BBL HEROic SkinTyte II-behandeling kan variëren. Erytheem (roodheid) wordt meestal binnen enkele minuten na de behandeling waargenomen. Een licht gevoel van zonnebrand in en rond het behandelde gebied is ook normaal en te verwachten. Deze reacties verdwijnen meestal binnen 1 tot 4 uur na de behandeling.

Behandel het behandelde gebied voorzichtig – WEES ZACHT!

Krab of peuter niet aan de huid.

Totdat de gevoeligheid volledig is verdwenen, vermijd het volgende:

- Het gebruik van geparfumeerde lotions of zepen
- Exfoliërende crèmes (zoals Retin-A, glycolzuur, salicylzuur en alfa-hydroxycuren)
- Acnecrèmes of -gels
- Loofahsponsen en agressief schrobben
- Heet of koud water – gebruik lauw water om te wassen
- Scheren
- Zwembaden en spa's met veel chemicaliën/chloor en sterke temperatuurschommelingen
- Activiteiten die overmatig zweten veroorzaken

Een koud kompres of een ijspack kan worden gebruikt om het behandelde gebied te verkoelen indien het erg warm aanvoelt. Dit is zelden nodig, maar als het gebeurt, is het meestal binnen de eerste 4 uur na de behandeling.

Make-up & Verzachting

Make-up mag direct na de behandeling worden aangebracht, **zolang de huid intact is** en er geen tekenen zijn van blaarvorming.

Vitamine E of Aloe Vera kan verzachtend werken op het behandelde gebied.

Pijn of Ongemak

Ongemak na de behandeling is meestal minimaal. Indien het behandelde gebied toch pijnlijk is, mag je een orale pijnstiller nemen, zoals Extra Sterke Tylenol of Advil.

Als de huid open is of als er een blaar verschijnt, breng dan een antibacteriële zalf aan en **neem onmiddellijk contact op met de kliniek**. Houd het getroffen gebied vochtig en vermijd direct zonlicht.

Zonbescherming

Vermijd blootstelling aan de zon strikt gedurende **minimaal 7 dagen** na de procedure. Het behandelde gebied is gevoeliger voor zonnebrand en pigmentveranderingen.

- Houd het gebied bedekt
- Gebruik een zonnebrandcrème met een **beschermingsfactor van minimaal SPF 30+**
- Herhaal het aanbrengen van zonnebrand om de 2 uur
- Vertraagde blaarvorming door zonblootstelling is gemeld tot **72 uur na de behandeling**

Vervolgbehandelingen

Vervolgbehandelingen worden gepland op basis van het advies van je behandelend specialist, doorgaans met een interval van **2-4 weken**. Het aantal benodigde behandelingen hangt af van jouw individuele huidconditie en de manier waarop je lichaam reageert op het licht.

Resultaten

De volledige effecten van de SkinTyte II-behandeling verschijnen geleidelijk. Het kan **3 tot 6 maanden** duren voordat het eindresultaat zichtbaar is, hoewel sommige patiënten eerder resultaat merken.

De resultaten kunnen tot **6 maanden** aanhouden, maar uit recente studies blijkt dat sommige thermische collageenveranderingen tot **meerdere jaren** zichtbaar blijven, afhankelijk van het natuurlijke verouderingsproces van de patiënt.